



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
*Ufficio scolastico Regionale per la Puglia*  
**1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII"**  
**C.so Aldo MORO, 68 - 70010 – VALENZANO (BA)**  
C.M. BAEE18400V  
C. F. e P. I.V.A. 93000440722  
Tel.0804676014- tel/fax 0804671404  
e-mail:baee18400v@istruzione.it  
pec baee18400v@pec.istruzione.it



sito web:  
1cdvalenzano.edu.it  
C.U. fatturazione UFY99Q

Al personale scolastico

Ai genitori degli alunni

Al sito web

**Oggetto: Segnalazione casi di scarlattina nella Scuola dell'Infanzia – plesso "San Giovanni Bosco"**

Si comunica che tra gli alunni della Scuola dell'Infanzia plesso "San Giovanni Bosco" sono stati accertati casi di scarlattina.

Si consiglia pertanto alle famiglie di sottoporre i propri figli a sorveglianza sanitaria, al fine di rilevare eventuali sintomi quali mal di gola e febbre. Solo in caso di insorgenza di sintomi, essendo una malattia contagiosa, è bene consultare il medico.

I collaboratori scolastici avranno cura di areare il più possibile i locali e disinfettare pavimenti delle aule, banchi e sedie, giocattoli e sussidi didattici.

Si fornisce, inoltre, nell'ambito di un'azione condivisa di educazione alla salute della comunità scolastica, un'informativa sulla scarlattina.

**DEFINIZIONE**

La scarlattina è una malattia infettiva batterica dovuta allo Streptococco beta emolitico di gruppo A.

**DESCRIZIONE**

Come ci si contagia. Ci si contagia da persona a persona, tramite le goccioline respiratorie di saliva, per contatto diretto con un soggetto infetto emesse con la tosse, gli starnuti o anche semplicemente parlando.

Un soggetto è molto contagioso durante la fase acuta della scarlattina, è poco infettante nel periodo che precede la malattia, e non lo è più dopo 24-48 ore dall'inizio della terapia antibiotica.

Periodo di incubazione. In seguito al contagio, lo Streptococco si moltiplica nella gola senza dare disturbi per 1-3 giorni, poi la malattia si manifesta.

Contagiosità. In genere i primi sintomi compaiono dopo 1-3 giorni dal contagio. Di norma un malato è contagioso da 1-2 giorni prima dell'inizio dei sintomi e per tutta la durata della malattia; se viene instaurata un'adeguata terapia antibiotica, dopo 48 ore il soggetto non è più contagioso.

La prevenzione. L'unico sistema per evitare la scarlattina è quello di tenere lontano i soggetti sani dalle persone già contagiate.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott.ssa Michela Lella**

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n.39/93